

## Πώς μπορώ να εμβολιάσω το παιδί μου για τον HPV;

Το εμβόλιο χορηγείται ΔΩΡΕΑΝ για τους δικαιούχους του ΓεΣΥ μέσω των Προσωπικών Παιδιάτρων και για τους μη δικαιούχους του ΓεΣΥ μέσω των Κέντρων Προστασίας Μητρότητας και Παιδιού. Χορηγείται σε 2 δόσεις, σε κορίτσια και αγόρια από την ηλικία των 9 ετών μέχρι την ηλικία των 13 ετών και 364 ημερών.

ΕΠΑΡΧΙΑ	ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ	ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ	Κέντρο Υγείας Λατσιών	22849153
ΛΕΜΕΣΟΣ	Παλιό Νοσοκομείο Λεμεσού	25829068
ΛΑΡΝΑΚΑ	Παλιό Νοσοκομείο Λάρνακας	24818047
ΠΑΦΟΣ	Γενικό Νοσοκομείο Πάφου	26803246

Εγώ θα έκανα  
τα πάντα  
να προστατέψω  
το παιδί μου...  
ΕΣΥ;;



στέλεχος και επίσημο  
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Αριθμός έκδοσης: 3  
Ημερομηνία έκδοσης: 1/26



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ιατρικές Υπηρεσίες και  
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

# HPV

(ιός ανθρωπίνων θηλωμάτων)



## Τι είναι η HPV λοίμωξη;

Η HPV λοίμωξη είναι μια ιογενής λοίμωξη και αποτελεί την πιο συχνή σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη παγκοσμίως.

## Πώς μεταδίδεται;

Ο HPV μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής, κυρίως σεξουαλικής με σύντροφο που έχει μολυνθεί από τον ιό, ακόμα και χωρίς εμφανείς βλάβες και πιο σπάνια από μητέρα που έχει μολυνθεί, στο παιδί της κατά τον τοκετό.

## Ποια είναι τα συμπτώματα της HPV λοίμωξης;

Οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνονται από τον HPV δεν εμφανίζουν συμπτώματα και η λοίμωξη υποχωρεί αυτόματα χωρίς καμία παρέμβαση. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, η HPV λοίμωξη επιμένει και οδηγεί στην εκδήλωση συμπτωμάτων ή/και επιπλοκών.

## Ποιες είναι οι επιπλοκές της HPV λοίμωξης;

Η HPV λοίμωξη μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση:

- κονδυλωμάτων στα γεννητικά όργανα και τον πρωκτό,
- προκαρκινικές αλλοιώσεις και καρκίνο σε τράχηλο μήτρας, κόλπο, αιδοίο, πρωκτό, πέος, στοματοφάρυγγα

## Πώς μπορεί κανείς να προφυλαχθεί από τον ιό HPV;

Η χρήση προφυλακτικού μειώνει την πιθανότητα μόλυνσης από τον ιό χωρίς όμως να την μηδενίζει. Ο μοναδικός αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής της μόλυνσης από τον HPV είναι ο εμβολιασμός.

## Πότε συνιστάται να γίνεται ο εμβολιασμός;

Ο HPV εμβολιασμός θα πρέπει να διενεργείται σε κορίτσια και αγόρια πριν την έναρξη των σεξουαλικών επαφών. Έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ανοσοποίηση έναντι του ιού HPV με αποτέλεσμα οι έφηβοι να είναι προστατευμένοι με την έναρξη της σεξουαλικής τους ζωής.

Ωστόσο, ο εμβολιασμός ενδείκνυται και για γυναίκες και άνδρες μετά την έναρξη των σεξουαλικών επαφών, για την πρόληψη από τύπους του ιού από τους οποίους δεν έχει κάποιος ήδη μολυνθεί.

## Γιατί να εμβολιάσω τον γιό μου αφού ο ιός αυτός προκαλεί κυρίως καρκίνο του τραχήλου της μήτρας;

Ο ιός HPV προσβάλλει τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες. Εκτός από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, ευθύνεται και για καρκίνους του πέους, του πρωκτού, του στόματος και του φάρυγγα, καθώς και για τα γεννητικά κονδυλώματα και στα δύο φύλα. Ο εμβολιασμός των αγοριών σε προεφηβική ηλικία τα προστατεύει άμεσα και συμβάλλει έμμεσα στην προστασία των μελλοντικών τους συντρόφων.

## Το εμβόλιο για τον HPV προκαλεί σοβαρές παρενέργειες;

Οι παρενέργειες είναι ήπιες. Συχνότερες είναι ο πόνος, πρήξιμο και ερυθρότητα στο σημείο της ένεσης, πονοκέφαλος, ναυτία, χαμηλός πυρετός. Πολύ σπάνια ζάλη-τάση για λιποθυμία. Δεν έχουν αναφερθεί οποιεσδήποτε σοβαρές παρενέργειες.